

# ÉTUDE DES SOLUTIONS MÉROMORPHES D'ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

**A. Lesfari**

Département de Mathématiques

Faculté des Sciences

Université Chouaïb Doukkali

B.P. 20, El-Jadida, Maroc.

E-mail : Lesfariahmed@yahoo.fr , lesfari@ucd.ac.ma

Abstract. In this paper we shall study differential equations in the complex domain. The method of indeterminate coefficients and the majorant method lead to a proof of the existence and uniqueness of meromorphic solution of differential equations. We discuss their connection with the concept of algebraic integrability systems.

AMS Subject Classification : 34M05, 34M45, 70H06.

## 1 Position du problème

Dans ce travail, nous envisagerons l'étude des équations différentielles dans le domaine complexe. Soit le système d'équations différentielles non-linéaires

$$\begin{aligned} \frac{dw_1}{dz} &= f_1(z, w_1, \dots, w_n), \\ &\vdots \\ \frac{dw_n}{dz} &= f_n(z, w_1, \dots, w_n), \end{aligned} \tag{1}$$

où  $f_1, \dots, f_n$  sont des fonctions de  $n+1$  variables complexes  $z, w_1, \dots, w_n$  et qui appliquent un domaine de  $\mathbb{C}^{n+1}$  dans  $\mathbb{C}$ . Le problème de Cauchy consiste en la recherche d'une solution  $(w_1(z), \dots, w_n(z))$  dans un voisinage d'un point  $z_0$ , passant par le point donné  $(z_0, w_1^0, \dots, w_n^0)$  c'est-à-dire satisfaisant aux conditions initiales

$$\begin{aligned} w_1(z_0) &= w_1^0, \\ &\vdots \\ w_n(z_0) &= w_n^0. \end{aligned}$$

Notons que le système (1) peut s'écrire sous forme vectorielle dans  $\mathbb{C}^n$

$$\frac{dw}{dz} = f(z, w(z)),$$

en posant  $w = (w_1, \dots, w_n)$  et  $f = (f_1, \dots, f_n)$ . Dans ce cas, le problème de Cauchy consistera à déterminer la solution  $w(z)$  telle que

$$w(z_0) = w_0 = (w_1^0, \dots, w_n^0).$$

Commençons tout d'abord par décrire quelques résultats connus. On sait que lorsque les fonctions  $f_1, \dots, f_n$  sont holomorphes au voisinage du point  $(z_0, w_1^0, \dots, w_n^0)$  alors le problème de Cauchy admet une solution holomorphe et une seule. Une question naturelle se pose : le problème de Cauchy peut-il admettre quelque solution non holomorphe au voisinage du point  $(z_0, w_1^0, \dots, w_n^0)$ ? Lorsque les fonctions  $f_1, \dots, f_n$  sont holomorphes, la réponse est négative. D'autres circonstances peuvent se produire pour le problème de Cauchy relatif au système d'équations différentielles (1), lorsque l'hypothèse d'holomorphic relative aux fonctions  $f_1, \dots, f_n$  n'est plus satisfaite au voisinage d'un point. On constate dans une telle éventualité que les comportements des solutions peuvent revêtir les aspects les plus divers. En général, les singularités des solutions sont de deux types : mobiles ou fixes, suivant qu'elles dépendent ou non des conditions initiales. Des résultats importants ont été obtenus par Painlevé [14]. Supposons par exemple que le système (1) s'écrit sous la forme

$$\begin{aligned} \frac{dw_1}{dz} &= \frac{P_1(z, w_1, w_n)}{Q_1(z, w_1, \dots, w_n)}, \\ &\vdots \\ \frac{dw_n}{dz} &= \frac{P_n(z, w_1, \dots, w_n)}{Q_n(z, w_1, \dots, w_n)}, \end{aligned}$$

avec

$$\begin{aligned} P_k(z, w_1, \dots, w_n) &= \sum_{0 \leq i_1, \dots, i_n \leq p} A_{i_1, \dots, i_n}^{(k)}(z) w_1^{i_1} \dots w_n^{i_n}, \quad 1 \leq k \leq n, \\ Q_k(z, w_1, \dots, w_n) &= \sum_{0 \leq j_1, \dots, j_n \leq q} B_{j_1, \dots, j_n}^{(k)}(z) w_1^{j_1} \dots w_n^{j_n}, \quad 1 \leq k \leq n, \end{aligned}$$

des polynômes à plusieurs indéterminées  $w_1, \dots, w_n$  et à coefficients algébriques en  $z$ . On sait

(i) que les singularités fixes sont constituées par quatre ensembles de points. Le premier est l'ensemble des points singuliers des coefficients  $A_{i_1, \dots, i_n}^{(k)}(z)$ ,  $B_{j_1, \dots, j_n}^{(k)}(z)$  intervenant dans les polynômes  $P_k(z, w_1, \dots, w_n)$  et  $Q_k(z, w_1, \dots, w_n)$ .

En général cet ensemble contient le point  $z = \infty$ . Le second ensemble est constitué des points  $\alpha_j$  tels que

$$Q_k(z, w_1, \dots, w_n) = 0,$$

circonstance qui se produit si les coefficients  $B_{j_1, \dots, j_n}^{(k)}(z)$  s'annulent tous pour  $z = \alpha_j$ . Le troisième est l'ensemble des points  $\beta_l$  tels que pour certaines valeurs  $(w_{1'}, \dots, w_{n'})$  de  $(w_1, \dots, w_n)$ , on ait

$$P_k(\beta_l, w_{1'}, \dots, w_{n'}) = Q_k(\beta_l, w_{1'}, \dots, w_{n'}) = 0.$$

Dès lors les seconds membres du système ci dessus se présentent sous la forme indéterminée  $\frac{0}{0}$  aux points  $(\beta_l, w_{1'}, \dots, w_{n'})$ . Enfin, l'ensemble des points  $\gamma_m$  tels qu'il existe des valeurs  $u_1, \dots, u_n$ , pour lesquelles

$$R_k(\gamma_m, u_1, \dots, u_n) = S_k(\gamma_m, u_1, \dots, u_n) = 0,$$

où  $R_k$  et  $S_k$  sont des polynômes en  $u_1, \dots, u_n$  obtenus à partir de  $P_k$  et  $Q_k$  en posant

$$w_1 = \frac{1}{u_1}, \dots, w_n = \frac{1}{u_n}.$$

Chacun de ces ensembles ne comporte qu'un nombre fini d'éléments. Les singularités fixes du système en question sont en nombre fini.

(ii) que les singularités mobiles de solutions de ce système sont des singularités mobiles algébriques : pôles et (ou) points critiques algébriques. Il n'y a pas de points singuliers essentiels pour la solution  $(w_1, \dots, w_n)$ .

Considérant le système d'équations différentielles (1), peut-on trouver des conditions suffisantes d'existence et d'unicité de solutions méromorphes? Nous établirons un théorème d'existence et d'unicité pour la solution du problème de Cauchy relatif au système d'équations différentielles (1), en faisant appel à la méthode des coefficients indéterminés. La solution sera explicitée sous la forme d'une série de Laurent. Il se posera dès lors le problème de la convergence. Celui-ci sera résolu par la méthode des fonctions majorantes (pour cette notion voir par exemple [3, 7, 9]). Nombreux sont les problèmes, aussi bien théorique que pratique, où apparaissent des équations différentielles dont le second membre n'est pas holomorphe. Nous verrons, dans la dernière section, que les solutions méromorphes dépendant d'un nombre suffisant de paramètres libres jouent un rôle crucial dans l'étude des équations différentielles dites algébriquement intégrables.

## 2 Existence et unicité de solutions méromorphes

Dans ce qui suivra, nous envisagerons le problème de Cauchy relatif au système normal (1) dans l'hypothèse où  $f_1, \dots, f_n$  ne dépendent pas explici-

tement de  $z$  c'est-à-dire

$$\begin{aligned} \frac{dw_1}{dz} &= f_1(w_1, \dots, w_n), \\ &\vdots \\ \frac{dw_n}{dz} &= f_n(w_1, \dots, w_n), \end{aligned} \tag{2}$$

On suppose que  $f_1, \dots, f_n$  sont des fonctions rationnelles en  $w_1, \dots, w_n$  et que le système (2) est quasi-homogène, c'est-à-dire ils existent des entiers positifs  $s_1, \dots, s_n$  telles que

$$f_i(\alpha^{s_1} w_1, \dots, \alpha^{s_n} w_n) = \alpha^{s_i+1} f_i(w_1, \dots, w_n), \quad 1 \leq i \leq n,$$

pour chaque constante non nulle  $\alpha$ . Autrement dit, le système (2) est invariant par la transformation

$$z \longrightarrow \alpha^{-1} z, \quad w_1 \longrightarrow \alpha^{s_1} w_1, \dots, \quad w_n \longrightarrow \alpha^{s_n} w_n.$$

Notons que si le déterminant

$$\Delta \equiv \det(w_j \frac{\partial f_i}{\partial w_j} - \delta_{ij} f_i)_{1 \leq i, j \leq n}, \tag{3}$$

est non identiquement nul, alors le choix des nombres  $s_1, \dots, s_n$  est unique.

Dans tout ce qui va suivre, nous supposons, pour simplifier les notations que  $z_0 = w_0 = 0$ , ce qui n'affecte pas la généralité des résultats.

**THÉORÈME 1** *Supposons que*

$$w_i = \frac{1}{z^{s_i}} \sum_{k=0}^{\infty} c_i^{(k)} z^k, \quad 1 \leq i \leq n, \tag{4}$$

où  $c^{(0)} \neq 0$ , soit la solution formelle en séries de Laurent, obtenue par la méthode des coefficients indéterminés, du système quasi-homogène (2). Alors, les coefficients  $c_i^{(0)}$  satisfont aux équations non-linéaires

$$s_i c_i^{(0)} + f_i(c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}) = 0, \tag{5}$$

où  $1 \leq i \leq n$ , tandis que  $c_i^{(1)}, c_i^{(2)}, \dots$  satisfont chacun à un système d'équations linéaires de la forme

$$(\mathcal{L} - k\mathcal{I})c^{(k)} = \text{polynôme en } c_i^{(0)}, \dots, c_i^{(k-1)}, \quad 1 \leq i \leq n, \quad k \geq 1, \tag{6}$$

où  $c^{(k)} = (c_1^{(k)}, \dots, c_n^{(k)})^\top$  et

$$\mathcal{L} \equiv \left( \frac{\partial f_i}{\partial w_j}(c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}) + \delta_{ij} s_i \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

est la matrice jacobienne de (5). En outre, la série (4) est convergente.

*Démonstration* : En substituant (4) dans (2), tout en tenant compte de la quasi-homogénéité du système, on obtient

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} (k - s_i) c_i^{(k)} z^{k-s_i-1} &= f_i \left( \sum_{k=0}^{\infty} c_1^{(k)} z^{k-s_1}, \dots, \sum_{k=0}^{\infty} c_n^{(k)} z^{k-s_n} \right), \\
&= f_i \left( z^{-s_1} (c_1^{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} c_1^{(k)} z^k), \dots, z^{-s_n} (c_n^{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} c_n^{(k)} z^k) \right), \\
&= z^{-s_i-1} f_i(c_1^{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} c_1^{(k)} z^k, \dots, c_n^{(0)} + \sum_{k=1}^{\infty} c_n^{(k)} z^k).
\end{aligned}$$

Ensuite, on développe le second membre comme suit

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{\infty} (k - s_i) c_i^{(k)} z^k &= f_i(c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial w_j} (c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}) \sum_{k=1}^{\infty} c_j^{(k)} z^k \\
&\quad + \sum_{k=2}^{\infty} z^k \sum_{(\alpha, \tau) \in D_k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^\alpha f_i}{\partial w^\alpha} (c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}) \prod_{j=1}^n (c_j^{(\tau_j)})^{\alpha_j},
\end{aligned}$$

où  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ,  $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_n)$ ,

$$|\alpha| = \sum_{j=1}^n \alpha_j, \quad \alpha! = \prod_{j=1}^n \alpha_j!,$$

$$D_k = \{(\alpha, \tau) : \tau_j > 0, \forall j, |\alpha| > 2, \sum_{j=1}^n \alpha_j \tau_j = k\}.$$

En identifiant les termes ayant même puissance au premier et au second membre, on obtient successivement pour  $k = 0$  l'expression (5), pour  $k = 1$ ,

$$(\mathcal{L} - \mathcal{I}) c^{(1)} = 0,$$

et pour  $k \geq 2$ ,

$$((\mathcal{L} - k\mathcal{I})c^{(k)})_i = - \sum_{(\alpha, \tau) \in D_k} \frac{1}{\alpha!} \frac{\partial^\alpha f_i}{\partial w^\alpha} (c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)}) \prod_{j=1}^n (c_j^{(\tau_j)})^{\alpha_j}, \quad (7)$$

où  $\tau_j > 0$ ,  $\sum_{j=1}^n \alpha_j \tau_j = k$ , ce qui conduit aux expressions (explicites) (6). La solution obtenue par la méthode des coefficients indéterminés est formelle du fait que nous l'obtenons en effectuant sur des séries, que nous supposons a priori convergentes, diverses opérations dont la validité reste à justifier. Le théorème se trouvera donc établi dès que nous aurons vérifié que ces séries sont convergentes. On utilise à cette fin la méthode des fonctions majorantes

ainsi que les travaux de M. Adler-P. van Moerbeke [1] et J.P. Françoise [4]. Notons tout d'abord que des paramètres libres apparaissent soit dans le système (5) de  $n$  équations à  $n$  inconnues, lorsque celui-ci admet un ensemble continue de solutions, soit par le fait que  $\lambda_i \equiv k \in \mathbb{N}^*, 1 \leq i \leq n$ , est une valeur propre de la matrice  $\mathcal{L}$ . Dès lors, les coefficients peuvent être vus comme étant des fonctions rationnelles sur une variété affine  $V$ , de fibre le lieu

$$\bigcap_{i=1}^n \left\{ s_i c_i^{(0)} + f_i \left( c_1^{(0)}, \dots, c_n^{(0)} \right) = 0 \right\}.$$

Soit  $n_0 \in V$  et soit  $K$  un sous-ensemble compact de  $V$ , contenant un voisinage ouvert de  $n_0$ . Notons que  $K$  peut-être muni de la topologie du plan complexe. Posons

$$A = 1 + \max \left\{ \left| c_1^{(\tau_1)}(n_0) \right|, \left| c_2^{(\tau_2)}(n_0) \right|, \dots, \left| c_n^{(\tau_n)}(n_0) \right| \right\}, \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq \tau_i \leq \lambda_n,$$

où  $\lambda_n$  désigne la plus grande valeur propre de la matrice  $\mathcal{L}$ . Soient  $B$  et  $C$  deux constantes avec  $C > A$  telles que dans le compact  $K$  on ait

$$\left| \frac{\partial^\alpha f_i}{\partial w^\alpha}(n_0) \right| \leq \alpha! B^{|\alpha|},$$

$$\left| (\mathcal{L}(n_0) - k\mathcal{I}_n)^{-1} \right| \leq C, \quad k \geq \lambda_n + 1.$$

De (7) on déduit que

$$\left| c_i^{(k)}(n_0) \right| \leq C \sum_{(\alpha, \tau) \in D} B^{|\alpha|} \prod_{j=1}^n \left| c_j^{(\tau_j)} \right|^{\alpha_j}, \quad k \geq \lambda_n + 1.$$

Considérons maintenant la série

$$\Phi(z) = Az + \sum_{k=2}^{\infty} \beta_k z^k,$$

où  $\beta_k$  sont des nombres réels définis inductivement par  $\beta_1 \equiv A$  et

$$\beta_k \equiv C \sum_{(\alpha, \tau) \in D} B^{|\alpha|} \prod_{j=1}^n \beta_{\tau_j}^{\alpha_j}, \quad k \geq 2.$$

On vérifie aisément par récurrence que la série  $\Phi(z)$  est une majorante pour

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_i^{(k)} z^k, \quad 1 \leq i \leq n.$$

En effet, on a  $|c_i^{(1)}| \leq A$ . Supposons que  $|c_i^{(j)}| \leq \beta_j, j < k, \forall i$ . Alors

$$\begin{aligned} |c_i^{(k)}(n_0)| &\leq C \sum_{(\alpha, \tau) \in D} B^{|\alpha|} \prod_{j=1}^n |c_j^{(\tau_j)}|^{\alpha_j}, \quad k \geq \lambda_n + 1, \\ &\leq C \sum_{(\alpha, \tau) \in D} B^{|\alpha|} \prod_{j=1}^n |\beta_{\tau_j}^{\alpha_j}|, \\ &= \beta_k. \end{aligned}$$

D'autre part, il résulte de la définition des nombres  $\beta_k$  que

$$\Phi(z) = Az + CB^2 \frac{(n\Phi(z))^2}{1 - Bn\Phi(z)}.$$

La racine

$$\Phi(z) = \frac{1 + nABz - \sqrt{(1 - 2nAB(1 + 2nBC)z + n^2A^2B^2z^2)}}{2nB(1 + nBC)},$$

fournit la majorante cherchée. D'où la possibilité d'un développement en série entière au voisinage de  $z = 0$ . Ceci achève la démonstration.  $\square$

**REMARQUE 1** La série (4) est l'unique solution méromorphe dans le sens où cette solution résulte de ce que les coefficients  $c_i^{(k)}$  se trouvent déterminés de façon univoque avec la méthode de calcul adopté.

**REMARQUE 2** Le résultat du théorème précédent s'applique à l'équation différentielle quasi-homogène d'ordre  $n$  suivante :

$$\frac{d^n w}{dz^n} = f\left(w, \frac{dw}{dz}, \dots, \frac{d^{n-1}w}{dz^{n-1}}\right). \quad (8)$$

$f$  étant une fonction rationnelle en  $w, \frac{dw}{dz}, \dots, \frac{d^{n-1}w}{dz^{n-1}}$  et

$$\begin{aligned} w(z_0) &= w_1^0, \\ \frac{dw}{dz}(z_0) &= w_2^0, \\ &\vdots \\ \frac{d^{n-1}w}{dz^{n-1}}(z_0) &= w_n^0. \end{aligned}$$

En effet, l'équation (8) se ramène à un système de  $n$  équations du premier

ordre en posant

$$\begin{aligned} w(z) &= w_1(z), \\ \frac{dw}{dz}(z) &= w_2(z), \\ &\vdots \\ \frac{d^{n-1}w}{dz^{n-1}}(z) &= w_n(z). \end{aligned}$$

On obtient ainsi

$$\begin{aligned} \frac{dw_1}{dz} &= w_2, \\ \frac{dw_2}{dz} &= w_3, \\ &\vdots \\ \frac{dw_{n-1}}{dz} &= w_n, \\ \frac{dw_n}{dz} &= f(w_1, w_2, \dots, w_n). \end{aligned}$$

Un tel système constitue un cas particulier du système normal (2).

### 3 Connection avec l'intégrabilité algébrique des systèmes hamiltoniens

Considérons un système hamiltonien

$$\frac{dw}{dz} = J(w) \frac{\partial H}{\partial w}, \quad w \in \mathbb{R}^n, \quad n = 2m + k, \quad (9)$$

où  $H$  est l'hamiltonien et  $J(w)$  est une matrice réelle antisymétrique telle que les crochets de Poisson correspondants vérifient l'identité de Jacobi :

$$\{\{H, F\}, G\} + \{\{F, G\}, H\} + \{\{G, H\}, F\} = 0, \forall H, F, G \in C^\infty(\mathbb{R}^n),$$

où

$$\{H, F\} = \sum_{i,j} J_{ij} \frac{\partial H}{\partial w_i} \frac{\partial F}{\partial w_j}.$$

On suppose que le système (9) est complètement intégrable c'est-à-dire qu'il admet  $m + k$  intégrales premières  $H_1 = H, H_2, \dots, H_{m+k}$  fonctionnellement indépendantes dont  $m$  intégrales sont en involution (i.e.,  $\{H_i, H_j\} = 0$ ,  $1 \leq i, j \leq m$ ),  $k$  intégrales sont des fonctions de Casimir (i.e.,  $J \frac{\partial H_{m+i}}{\partial w} = 0$ ,  $1 \leq i \leq k$ ) et telles que pour presque tous les  $c_i \in \mathbb{R}$  les variétés invariantes

$$\bigcap_{i=1}^{m+k} \{w \in \mathbb{R}^n : H_i(w) = c_i\}, \quad (10)$$

sont compactes et connexes. D'après le théorème d'Arnold-Liouville [10], les variétés (10) sont difféomorphes aux tores réels  $T_{\mathbb{R}}^m = \mathbb{R}^m/\text{réseau}$ . En outre les flots définis par les champs de vecteurs  $W_{H_i}, 1 \leq i \leq m$ , sont des mouvements rectilignes sur ce tore et les équations du problème sont intégrables par quadratures.

Soient maintenant  $w \in \mathbb{C}^n, z \in \mathbb{C}$  et  $\Delta \subset \mathbb{C}^n$  un ouvert non vide de Zariski. Comme  $H_1, \dots, H_{m+k}$  sont fonctionnellement indépendantes, alors l'application

$$\varphi = (H_1, \dots, H_{m+k}) : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^{m+k},$$

est une submersion générique sur  $\Delta$ . Soit  $\mathbf{I} = \varphi(\mathbb{C}^n \setminus \Delta)$ , le lieu critique de  $\varphi$  et désignons par  $\text{adh}\mathbf{I}$  l'adhérence (ou fermeture) de Zariski de  $\mathbf{I}$  dans  $\mathbb{C}^{m+k}$ .

**DÉFINITION 1** *Le système différentiel (9) dont le côté droit est polynomial est algébriquement complètement intégrable si pour  $c = (c_1, \dots, c_{m+k}) \in \mathbb{C}^{m+k} \setminus \text{adh}\mathbf{I}$ , la fibre*

$$M_c \equiv \varphi^{-1}(c) = \bigcap_{i=1}^{m+k} \{w \in \mathbb{C}^n : H_i(w) = c_i\}, \quad (11)$$

est la partie affine d'une variété abélienne (i.e., un tore complexe  $T_{\mathbb{C}}^m \simeq \mathbb{C}^m/\text{réseau}$  qui possède un plongement dans un espace projectif). En outre, les flots  $g_{W_i}^z(w), w \in M_c, z \in \mathbb{C}$ , définies par les champs de vecteurs  $W_{H_1}, \dots, W_{H_m}$  sont des lignes droites sur  $T_{\mathbb{C}}^m$  c'est-à-dire

$$[g_{W_i}^z(w)]_j = f_j(p + z(k_1^i, \dots, k_n^i)),$$

où  $f_j(z_1, \dots, z_m)$  sont des fonctions abéliennes (méromorphes) sur le tore  $T_{\mathbb{C}}^m$ ,  $f_j(p) = w_j, 1 \leq j \leq n$ .

Soit  $\overline{M}_c$  la fermeture projective de  $M_c$  dans l'espace projectif complexe  $\mathbb{C}\mathbb{P}^n$  de dimension  $n$ . Alors  $\overline{M}_c$  n'est pas une variété abélienne puisque cette dernière n'est pas simplement connexe et ne peut donc en général être une intersection complète projective. Dès lors, pour que  $M_c$  soit la partie affine d'une variété abélienne, la variété  $\overline{M}_c$  doit être singulière à l'infini. En éclatant la singularité le long du lieu atteint par le flot et en implorant la partie du lieu qui n'est pas atteint par le flot, on montre que la variété  $\overline{M}_c$  se transforme en une variété abélienne  $\widetilde{M}_c$  et le lieu à l'infini se transforme en une ou plusieurs sous-variétés de codimension 1. Et c'est là où le théorème 1, va jouer un rôle crucial. On procède comme suit : soit  $w_i \longrightarrow u_i$  une transformation birationnelle telle qu'au voisinage de  $z = 0$ , on ait :

$$\begin{aligned} u_i &= \alpha_i + \circ(z), \quad 1 \leq i \leq n-1, \\ u_n &= z + \circ(z^2), \end{aligned}$$

où  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$  sont des paramètres libres. Les nouvelles variables  $u_i$  ont pour effet d'éclater la singularité de la variété projective  $\overline{M_c}$  le long du lieu à l'infini atteint par le flot. Exprimées dans ces nouvelles variables  $u_1, \dots, u_n$ , les équations différentielles sont régulières et holomorphes au voisinage de  $u_n = 0$  tandis que les équations définissant la fibre  $M_c$  s'écrivent sous la forme :

$$F_i(u_1(z), \dots, u_{n-1}(z), u_n(z)) = c_i, \quad 1 \leq i \leq m+k,$$

où  $F_1, \dots, F_{m+k}$  sont des polynômes en  $w$ . Pour  $z = 0$ , on obtient

$$F_i(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, 0) = a_i, \quad 1 \leq i \leq m+k,$$

et ces relations algébriques entre les paramètres libres  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$  fournissent les équations d'une sous-variété  $\mathcal{D}$  qui jouera, entre autres, un rôle important dans la compactification de la fibre  $M_c$ . En fait, les paramètres libres  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$  et la sous-variété  $\mathcal{D}$  peuvent s'obtenir directement de la manière suivante : d'abord l'on montre l'existence de solutions  $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$  du système (9) sous la forme de séries de Laurent (4) dépendant de  $n-1$  paramètres libres  $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ . En substituant ces développements dans le système (9), on voit (d'après le théorème 1) que les coefficients  $c^{(0)}, c^{(1)}, \dots$ , satisfont aux équations (5) et (6). L'étape suivante consiste à considérer la fermeture  $\mathcal{D}$  des composantes continues de l'ensemble des séries de Laurent de  $w(z)$  tels que :  $H_1(w) = a_1, \dots, H_{m+k}(w) = a_{m+k}$ . Plus précisément,

$$\mathcal{D} = \bigcap_{i=1}^{m+k} \{ \text{coefficient de } z^0 \text{ dans } H_i(w(z)) = a_i \}.$$

C'est une sous-variété (un diviseur) de codimension 1. Ensuite on procède à la compactification de la fibre  $M_c$  (11) en une variété abélienne  $\widetilde{M_c}$ . Cette compactification s'obtient par l'adjonction à  $M_c$  de ce diviseur  $\mathcal{D}$ .

### 3.1 Rotation d'un corps solide autour d'un point fixe

Les équations du mouvement d'un corps solide autour d'un point fixe s'écrivent sous la forme

$$\begin{aligned} \frac{dM}{dt} &= M \wedge \Omega + \mu g \Gamma \wedge L, \\ \frac{d\Gamma}{dt} &= \Gamma \wedge \Omega, \end{aligned} \tag{12}$$

où  $\wedge$  est le produit vectoriel dans  $\mathbb{R}^3$ ,  $M = (m_1, m_2, m_3)$  le moment angulaire du solide,  $\Omega = (m_1/I_1, m_2/I_2, m_3/I_3)$  la vitesse angulaire,  $I_1, I_2$  et  $I_3$ , les moments d'inertie,  $\Gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$  le vecteur vertical unitaire,  $\mu$  la masse du solide,  $g$  l'accélération de la pesanteur, et enfin,  $L = (l_1, l_2, l_3)$  le vecteur unitaire ayant pour origine le point fixe et dirigé vers le centre de gravité ;

tous ces vecteurs sont considérés dans un système mobile dont les coordonnées sont fixées aux axes principaux d'inertie. L'espace de configuration d'un solide avec un point fixe est le groupe des rotations :

$$SO(3) = \left\{ U \text{ matrice d'ordre trois} : U^{-1} = U^T, \det U = 1 \right\}.$$

C'est le groupe des matrices orthogonales d'ordre trois et le mouvement de ce solide est décrit par une courbe sur ce groupe. L'espace des vitesses angulaires de toutes les rotations est l'algèbre de Lie du groupe  $SO(3)$  ; c'est l'algèbre

$$so(3) = \left\{ A \text{ matrice d'ordre trois} : U^T + U = 0 \right\},$$

des matrices antisymétriques d'ordre trois. Cette algèbre est engendrée comme espace vectoriel par les matrices

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

qui vérifient les relations de commutation

$$[e_1, e_2] = e_3, \quad [e_2, e_3] = e_1, \quad [e_3, e_1] = e_2.$$

On utilisera dans la suite le fait que si l'on identifie  $so(3)$  à  $\mathbb{R}^3$  en envoyant  $(e_1, e_2, e_3)$  sur la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ , le crochet de  $so(3)$  correspond au produit vectoriel. En d'autres termes, considérons l'application

$$\mathbb{R}^3 \longrightarrow so(3), \quad a = (a_1, a_2, a_3) \longmapsto A = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix},$$

laquelle définit un isomorphisme entre les algèbres de Lie  $(\mathbb{R}^3, \wedge)$  et  $(so(3), [,])$  où

$$a \wedge b \longmapsto [A, B] = AB - BA.$$

En utilisant cet isomorphisme, on peut réécrire le système (12) sous la forme

$$\begin{aligned} \frac{dM}{dt} &= [M, \Omega] + \mu g [\Gamma, L], \\ \frac{d\Gamma}{dt} &= [\Gamma, \Omega], \end{aligned}$$

où

$$M = (M_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3} \equiv \sum_{i=1}^3 m_i e_i \equiv \begin{pmatrix} 0 & -m_3 & m_2 \\ m_3 & 0 & -m_1 \\ -m_2 & m_1 & 0 \end{pmatrix} \in so(3),$$

$$\Omega = (\Omega_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3} \equiv \sum_{i=1}^3 \omega_i e_i \equiv \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix} \in so(3),$$

$$\Gamma = (\gamma_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3} \equiv \sum_{i=1}^3 \gamma_i e_i \equiv \begin{pmatrix} 0 & -\gamma_3 & \gamma_2 \\ \gamma_3 & 0 & -\gamma_1 \\ -\gamma_2 & \gamma_1 & 0 \end{pmatrix} \in so(3),$$

et

$$L = \begin{pmatrix} 0 & -l_3 & l_2 \\ l_3 & 0 & -l_1 \\ -l_2 & l_1 & 0 \end{pmatrix} \in so(3),$$

En tenant compte du fait que  $M = I\Omega$ , alors les équations précédentes deviennent

$$\begin{aligned} \frac{dM}{dt} &= [M, \Lambda M] + \mu g [\Gamma, L], \\ \frac{d\Gamma}{dt} &= [\Gamma, \Lambda M], \end{aligned} \quad (13)$$

où

$$\Lambda M = (\Lambda_{ij} M_{ij})_{1 \leq i, j \leq 3} \equiv \sum_{i=1}^3 \lambda_i m_i e_i \equiv \begin{pmatrix} 0 & -\lambda_3 m_3 & \lambda_2 m_2 \\ \lambda_3 m_3 & 0 & -\lambda_1 m_1 \\ -\lambda_2 m_2 & \lambda_1 m_1 & 0 \end{pmatrix} \in so(3),$$

avec  $\lambda_i \equiv I_i^{-1}$ . Le système (13) est complètement intégrable seulement dans les cas suivants :

a) Cas d'Euler : Dans ce cas, on a

$$l_1 = l_2 = l_3 = 0,$$

c'est-à-dire le point fixe est son centre de gravité. Autrement dit, Les équations d'Euler (On parle aussi de mouvement d'Euler-Poinsot du solide) du mouvement de rotation d'un solide autour d'un point fixe, pris comme origine du repère lié au solide, lorsqu'aucune force extérieure n'est appliquée au système, peuvent s'écrire forme explicite

$$\begin{aligned} \frac{dm_1}{dt} &= (\lambda_3 - \lambda_2) m_2 m_3, \\ \frac{dm_2}{dt} &= (\lambda_1 - \lambda_3) m_1 m_3, \\ \frac{dm_3}{dt} &= (\lambda_2 - \lambda_1) m_1 m_2. \end{aligned} \quad (14)$$

Ces équations forment un champ de vecteurs hamiltonien de la forme (9) avec  $n = 3$ ,  $m = k = 1$ ,  $z = t$ ,  $w = (m_1, m_2, m_3)^\top$ ,

$$H = \frac{1}{2} (\lambda_1 m_1^2 + \lambda_2 m_2^2 + \lambda_3 m_3^2),$$

l'hamiltonien et

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -m_3 & m_2 \\ m_3 & 0 & -m_1 \\ -m_2 & m_1 & 0 \end{pmatrix} \in so(3).$$

Ces équations admettent deux intégrales premières quadratiques :  $H_1 = H$  et

$$H_2 = \frac{1}{2} (m_1^2 + m_2^2 + m_3^2).$$

Ces intégrales sont fonctionnellement indépendantes, en involution et le système en question est complètement intégrable. La résolution explicite des équations d'Euler est délicate dans le cas général où  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  et  $\lambda_3$  sont tous différents ; les solutions s'expriment à l'aide de fonctions elliptiques de Jacobi comme suit (pour le détail voir par exemple [15]) :

$$\begin{cases} m_1 = \sqrt{\frac{2H_1 - H_2\lambda_3}{\lambda_1 - \lambda_3}} \operatorname{cn}(t\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_3)(H_2\lambda_1 - 2H_1)}), \\ m_2 = \sqrt{\frac{2H_1 - H_2\lambda_3}{\lambda_2 - \lambda_3}} \operatorname{sn}(t\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_3)(H_2\lambda_1 - 2H_1)}), \\ m_3 = \sqrt{\frac{H_2\lambda_1 - 2H_1}{\lambda_1 - \lambda_3}} \operatorname{dn}(t\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_3)(H_2\lambda_1 - 2H_1)}). \end{cases} \quad (15)$$

Le mouvement de  $(m_1, m_2, m_3)$  s'effectue sur l'intersection  $M_c$  d'un ellipsoïde avec une sphère. Les deux cercles définies par  $M_c$ , forme la partie réelle d'un tore complexe de dimension 1, définie par la courbe elliptique  $\mathcal{E}$  :

$$\mathcal{E} : y^2 = (1 - s^2)(1 - k^2s^2).$$

où

$$k^2 \equiv \frac{(\lambda_1 - \lambda_2)(2H_1 - H_2\lambda_3)}{(\lambda_2 - \lambda_3)(H_2\lambda_1 - 2H_1)}.$$

et

$$s \equiv m_2 \sqrt{\frac{\lambda_2 - \lambda_3}{2H_1 - H_2\lambda_3}}$$

L'intersection complexe ( $\subset \mathbb{C}^3$ ) est la partie affine d'une courbe elliptique  $\overline{M}_c \in \mathbb{C}\mathbb{P}^3$ . On montre que  $\overline{M}_c$  est isomorphe à la courbe elliptique  $\mathcal{E}$ . En outre l'intersection réelle ( $\subset \mathbb{R}^3$ ) s'étend au tore complexe  $\mathbb{C}/\text{réseau}$  et le flot se linéarise sur ce tore. Si  $p(t) = (m_1(t), m_2(t), m_3(t))$ , est une solution de (14), la loi reliant  $p(t_1 + t_2)$  à  $p(t_1)$  et  $p(t_2)$  est la loi d'addition sur la courbe elliptique (voir [15]). D'après les équations (14), l'unique différentielle holomorphe sur  $\overline{M}_c$  est donnée par

$$\omega = \frac{dm_1}{(\lambda_3 - \lambda_2)m_2m_3} = \frac{dm_2}{(\lambda_1 - \lambda_3)m_1m_3} = \frac{dm_3}{(\lambda_2 - \lambda_1)m_1m_2},$$

d'où

$$t = \int_{p(0)}^{p(t)} \omega, \quad p(0) \in \overline{M}_c.$$

Le système (14) est invariant par les transformations

$$t \longrightarrow \alpha^{-1}t, \quad m_1 \longrightarrow \alpha m_1, \quad m_2 \longrightarrow \alpha m_2, \quad m_3 \longrightarrow \alpha m_3.$$

Celles-ci sont uniques puisque le déterminant (3) est égal à

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} -(\lambda_3 - \lambda_2) m_2 m_3 & (\lambda_3 - \lambda_2) m_2 m_3 & (\lambda_3 - \lambda_2) m_2 m_3 \\ (\lambda_1 - \lambda_3) m_1 m_3 & -(\lambda_1 - \lambda_3) m_1 m_3 & (\lambda_1 - \lambda_3) m_1 m_3 \\ (\lambda_2 - \lambda_1) m_1 m_2 & (\lambda_2 - \lambda_1) m_1 m_2 & -(\lambda_2 - \lambda_1) m_1 m_2 \end{vmatrix}, \\ &= 4(\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_1) m_1^2 m_2^2 m_3^2, \\ &\neq 0. \end{aligned}$$

On peut donc chercher des solutions du système (14) sous la forme de séries de Laurent

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{1}{t} (a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots), \\ m_2 &= \frac{1}{t} (b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots), \\ m_3 &= \frac{1}{t} (c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + \dots), \end{aligned}$$

dépendant de  $\dim(\text{espace de phase}) - 1 = 2$  paramètres libres. En substituant ces équations dans le système (14), on voit que :

1) les coefficients  $a_0, b_0, c_0$ , satisfont aux équations

$$\begin{aligned} a_0 + (\lambda_3 - \lambda_2) b_0 c_0 &= 0, \\ b_0 + (\lambda_1 - \lambda_3) a_0 c_0 &= 0, \\ c_0 + (\lambda_2 - \lambda_1) a_0 b_0 &= 0, \end{aligned}$$

dont les solutions sont

$$\begin{aligned} \underline{1^{er} \text{ cas}} : a_0 &= \frac{-1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_1 - \lambda_3)}}, & b_0 &= \frac{1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)}}, & c_0 &= \frac{1}{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_2)}}. \\ \underline{2^{me} \text{ cas}} : a_0 &= \frac{1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_1 - \lambda_3)}}, & b_0 &= \frac{1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)}}, & c_0 &= \frac{-1}{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_2)}}. \\ \underline{3^{me} \text{ cas}} : a_0 &= \frac{1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_1 - \lambda_3)}}, & b_0 &= \frac{-1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)}}, & c_0 &= \frac{1}{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_2)}}. \\ \underline{4^{me} \text{ cas}} : a_0 &= \frac{-1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_1 - \lambda_3)}}, & b_0 &= \frac{-1}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)}}, & c_0 &= \frac{-1}{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_2)}}. \end{aligned}$$

2) les coefficients  $a_1, b_1, c_1$ , satisfont aux équations

$$\begin{aligned} (\lambda_3 - \lambda_2) b_0 c_1 + (\lambda_3 - \lambda_2) b_1 c_0 &= 0, \\ (\lambda_1 - \lambda_3) a_0 c_1 + (\lambda_1 - \lambda_3) a_1 c_0 &= 0, \\ (\lambda_2 - \lambda_1) a_0 b_1 + (\lambda_2 - \lambda_1) a_1 b_0 &= 0, \end{aligned}$$

dont les solutions sont dans tous les cas :  $a_1 = b_1 = c_1 = 0$ .

3) les coefficients  $a_2, b_2, c_2$ , satisfont aux équations

$$\begin{aligned} a_2 - \lambda_3 b_0 c_2 - \lambda_3 b_1 c_1 - \lambda_3 b_2 c_0 + \lambda_2 b_0 c_2 + \lambda_2 b_1 c_1 + \lambda_2 b_2 c_0 &= 0, \\ b_2 - \lambda_1 a_0 c_2 - \lambda_1 a_1 c_1 - \lambda_1 a_2 c_0 + \lambda_3 a_0 c_2 + \lambda_3 a_1 c_1 + \lambda_3 a_2 c_0 &= 0, \\ c_2 - \lambda_2 a_0 b_2 - \lambda_2 a_1 b_1 - \lambda_2 a_2 b_0 + \lambda_1 a_0 b_2 + \lambda_1 a_1 b_1 + \lambda_1 a_2 b_0 &= 0, \end{aligned}$$

dont les solutions qui correspondent aux différents cas sont respectivement :

$$\underline{1^{er} \text{ cas}} : a_2 = \frac{\sqrt{(\lambda_3 - \lambda_2)}}{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)}} b_2 + \frac{\sqrt{(\lambda_3 - \lambda_2)}}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)}} c_2.$$

$$\underline{2^{me} \text{ cas}} : a_2 = -\frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_1 - \lambda_3}} b_2 + \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_2 - \lambda_1}} c_2.$$

$$\underline{3^{me} \text{ cas}} : a_2 = \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_1 - \lambda_3}} b_2 - \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_2 - \lambda_1}} c_2.$$

$$\underline{4^{me} \text{ cas}} : a_2 = -\frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_1 - \lambda_3}} b_2 - \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_2 - \lambda_1}} c_2.$$

où  $b_2$  et  $c_2$  sont deux paramètres libres.

Par conséquent, pour le premier cas on a

$$m_1 = \frac{-1}{t\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_1 - \lambda_3)}} + \left( \frac{\sqrt{(\lambda_3 - \lambda_2)}}{\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)}} b_2 + \frac{\sqrt{(\lambda_3 - \lambda_2)}}{\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)}} c_2 \right) t + \dots,$$

$$m_2 = \frac{1}{t\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)}} + b_2 t + \dots,$$

$$m_3 = \frac{1}{t\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_2)}} + c_2 t + \dots.$$

En substituant ces développements dans les intégrales premières  $H_1$  et  $H_2$ , on obtient

$$H_1 = 2 \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_2 - \lambda_1}} \left( \frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_3} \right) b_2 + 2 \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_1 - \lambda_3}} \left( \frac{1}{\lambda_3 - \lambda_2} - \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \right) c_2,$$

$$H_2 = 2 \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_2 - \lambda_1}} \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_3 - \lambda_2} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_3} \right) b_2 + 2 \frac{\sqrt{\lambda_3 - \lambda_2}}{\sqrt{\lambda_1 - \lambda_3}} \left( \frac{\lambda_3}{\lambda_3 - \lambda_2} - \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \right) c_2,$$

et on en déduit les relations

$$c_2 = \frac{1}{6\sqrt{(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_3 - \lambda_2)}} ((\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_1 H_1 - H_2) - (\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 H_1 - H_2)),$$

$$b_2 = \frac{1}{6\sqrt{(\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 - \lambda_2)}} ((\lambda_2 - \lambda_1)(\lambda_3 H_1 - H_2) - (\lambda_3 - \lambda_2)(\lambda_1 H_1 - H_2)).$$

On obtient évidemment des expressions similaires pour les autres cas. Il serait intéressant de comparer les solutions obtenues sous forme de séries de Laurent avec les solutions obtenues à l'aide des fonctions elliptiques de Jacobi (15) ainsi qu'avec celles obtenues par la méthode des déformations isospectrales (voir [10,14]).

b) Cas de Lagrange : Dans ce cas, on a

$$I_1 = I_2, \quad l_1 = l_2 = 0.$$

Il n'est pas difficile de montrer que dans ce cas aussi, l'intégration s'effectue à l'aide de fonctions elliptiques.

c) Cas de Kowalewski : Dans ce cas, on a

$$I_1 = I_2 = 2I_3, \quad l_3 = 0.$$

L'étude de ce cas est compliquée. Le système différentiel (13), s'écrit explicitement sous la forme

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 &= m_2 m_3, \\ \dot{m}_2 &= -m_1 m_3 + 2\gamma_3, \\ \dot{m}_3 &= -2\gamma_2, \\ \dot{\gamma}_1 &= 2m_3 \gamma_2 - m_2 \gamma_3, \\ \dot{\gamma}_2 &= m_1 \gamma_3 - 2m_3 \gamma_1, \\ \dot{\gamma}_3 &= m_2 \gamma_1 - m_1 \gamma_2, \end{aligned} \tag{16}$$

où, sans restreindre la généralité, nous avons choisi  $l_2 = 0$ ,  $\mu g l_1 = 1$ ,  $I_3 = 1$  et nous avons utilisé la substitution  $t \rightarrow 2t$ . Ces équations forment un champ de vecteurs hamiltonien de la forme (9) avec  $n = 6$ ,  $m = k = 2$ ,  $z = t$ ,  $w = (m_1, m_2, m_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^\top$ ,

$$H = \frac{1}{2} (m_1^2 + m_2^2) + m_3^2 + 2\gamma_1,$$

l'hamiltonien et

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -m_3 & m_2 & 0 & -\gamma_3 & \gamma_2 \\ m_3 & 0 & -m_1 & \gamma_3 & 0 & -\gamma_1 \\ -m_2 & m_1 & 0 & -\gamma_2 & \gamma_1 & 0 \\ 0 & -\gamma_3 & \gamma_2 & 0 & 0 & 0 \\ \gamma_3 & 0 & -\gamma_1 & 0 & 0 & 0 \\ -\gamma_2 & \gamma_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En plus des trois intégrales premières

$$\begin{aligned} H_1 &\equiv H, \\ H_2 &= m_1 \gamma_1 + m_2 \gamma_2 + m_3 \gamma_3, \\ H_3 &= \gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2, \end{aligned}$$

le système ci-dessus admet une quatrième intégrale première quartique obtenue par Kowalewski

$$H_4 = \left( \left( \frac{m_1 + im_2}{2} \right)^2 - (\gamma_1 + i\gamma_2) \right) \left( \left( \frac{m_1 - im_2}{2} \right)^2 - (\gamma_1 - i\gamma_2) \right).$$

Les intégrales premières  $H_1$  et  $H_4$  sont en involution, tandis que  $H_1$  et  $H_3$  sont triviaux. Soit

$$M_c = \bigcap_{k=1}^4 \{x : H_k(x) = c_k\},$$

la variété affine définie par l'intersection des quatre constantes du mouvement. Soit

$$(m_1, m_2, m_3, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \longmapsto (x_1, x_2, m_3, y_1, y_2, \gamma_3),$$

une transformation biunivoque de  $M_c$  où

$$\begin{aligned} 2x_1 &= m_1 + im_2, & y_1 &= x_1^2 - (\gamma_1 + i\gamma_2), \\ 2x_2 &= m_1 - im_2, & y_2 &= x_2^2 - (\gamma_1 - i\gamma_2). \end{aligned}$$

Alors, le quotient  $M_c/\sigma$  par l'involution

$$\sigma : M_c \longrightarrow M_c \quad (x_1, x_2, m_3, y_1, y_2, \gamma_3) \longmapsto (x_1, x_2, -m_3, y_1, y_2, -\gamma_3), \quad (17)$$

est une surface  $S$  (de Kummer)

$$\begin{aligned} y_1 y_2 &= c_4, \\ y_1 R(x_2) + y_2 R(x_1) + R_1(x_1, x_2) + c_4(x_1 - x_2)^2 &= 0, \end{aligned}$$

où

$$R(x) = -x^4 + c_1 x^2 - 2c_2 x + 1 - c_4,$$

est un polynôme de degré 4 en  $x$  et

$$R_1(x_1, x_2) = -c_1 x_1^2 x_2^2 - c_2 (c_2 - 2x_1 x_2 (x_1 + x_2)) + (1 - c_4) (c_1 - (x_1 + x_2)^2),$$

un autre polynôme de degré 2 en  $x_1, x_2$ . Les points de ramification de  $M_c$  sur  $S$  sont donnés par les points fixes de l'involution  $\sigma$  (17) et sont en nombre de 8. La surface  $S$  est un revêtement double du plan  $(x_1, x_2)$ , ramifié le long de deux courbes elliptiques se coupant exactement aux 8 points fixes de l'involution  $\sigma$ . Ces courbes donnent lieu à l'équation différentielle d'Euler

$$\frac{dx_1}{\sqrt{R(x_1)}} \pm \frac{dx_2}{\sqrt{R(x_2)}} = 0,$$

à laquelle se trouvent liés les fameuses variables de Kowalewski

$$\begin{aligned} s_1 &= \frac{R_1(x_1, x_2) - \sqrt{R(x_1)}\sqrt{R(x_2)}}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{c_1}{2}, \\ s_2 &= \frac{R_1(x_1, x_2) + \sqrt{R(x_1)}\sqrt{R(x_2)}}{(x_1 - x_2)^2} + \frac{c_1}{2}, \end{aligned}$$

et peuvent être vues comme étant des formules d'addition pour la fonction elliptique de Weierstrass (voir [8]). En termes des variables  $s_1$  et  $s_2$ , le système (16) devient

$$\begin{aligned}\frac{ds_1}{\sqrt{P_5(s_1)}} \pm \frac{ds_2}{\sqrt{P_5(s_2)}} &= 0, \\ \frac{s_1 ds_1}{\sqrt{P_5(s_1)}} \pm \frac{s_2 ds_2}{\sqrt{P_5(s_2)}} &= dt,\end{aligned}$$

où  $P_5(s)$  est un polynôme de cinquième degré et l'intégration s'effectue au moyen des fonctions hyperelliptiques de genre 2.

En utilisant le théorème 1, on montre que le système (13) dans le cas de Kowalewski, admet deux familles de solutions en séries de Laurent méromorphes

$$M = \sum_{k=0}^{\infty} M^{(k)} t^{k-1}, \quad \Gamma = \sum_{k=0}^{\infty} \Gamma^{(k)} t^{k-2},$$

dépendant de cinq paramètres libres tels que : les coefficients  $M^{(0)}$  et  $\Gamma^{(0)}$  satisfont au système non-linéaire

$$\begin{aligned}M^{(0)} + [M^{(0)}, \Lambda M^{(0)}] + [\Gamma^{(0)}, L] &= 0, \\ 2\Gamma^{(0)} + [\Gamma^{(0)}, \Lambda M^{(0)}] &= 0,\end{aligned}\tag{18}$$

dépendant d'une variable libre  $\alpha$  et définissant deux droites. Tandis que  $M^{(k)}$  et  $\Gamma^{(k)}$  satisfont aux systèmes linéaires

$$\begin{aligned}(L - kI) \begin{pmatrix} M^{(1)} \\ \Gamma^{(1)} \end{pmatrix} &= 0, \\ (L - kI) \begin{pmatrix} M^{(k)} \\ \Gamma^{(k)} \end{pmatrix} &= \begin{cases} -\sum_{i=1}^{k-1} [M^{(i)}, \Lambda M^{(k-i)}] \\ -\sum_{i=1}^{k-1} [\Gamma^{(i)}, \Lambda M^{(k-i)}] \end{cases}, \quad \text{pour } k \geq 2,\end{aligned}$$

où  $L$  est la matrice jacobienne de (18). Ces systèmes fournissent une variable libre à chacun des niveaux  $k = 1, 2, 3$  et 4. Explicitement, on a  
(\*) 1<sup>ère</sup> famille de solutions en séries de Laurent méromorphes :

$$\begin{aligned}m_1(t) &= \frac{\alpha}{t} + i(\alpha^2 - 2)\beta + o(t), \\ m_2(t) &= \frac{i\alpha}{t} - \alpha^2\beta + o(t), \\ m_3(t) &= \frac{i}{t} + \alpha\beta + o(t), \\ \gamma_1(t) &= \frac{1}{2t^2} + o(t), \\ \gamma_2(t) &= \frac{i}{2t^2} + o(t), \\ \gamma_3(t) &= \frac{\beta}{t} + o(t).\end{aligned}$$

(\*\*) 2<sup>ème</sup> famille de solutions en séries de Laurent méromorphes :

$$\begin{aligned}
m_1(t) &= \frac{\alpha}{t} - i(\alpha^2 - 2)\beta + o(t), \\
m_2(t) &= -\frac{i\alpha}{t} - \alpha^2\beta + o(t), \\
m_3(t) &= -\frac{i}{t} + \alpha\beta + o(t), \\
\gamma_1(t) &= \frac{1}{2t^2} + o(t), \\
\gamma_2(t) &= -\frac{i}{2t^2} + o(t), \\
\gamma_3(t) &= \frac{\beta}{t} + o(t).
\end{aligned}$$

Les diviseurs des pôles des fonctions  $M$  et  $\Gamma$  sont deux courbes algébriques

$$\mathcal{D}_\varepsilon : \beta^4 (\alpha^2 - 1)^2 - (c_1\beta^2 - 2\varepsilon c_2\beta - 1)(\alpha^2 - 1) + c_4 = 0, \quad \varepsilon^2 = -1, \quad (19)$$

irréductibles isomorphes et chacune de genre 3. Ce sont deux revêtements

$$\mathcal{D}_\varepsilon \longrightarrow \mathcal{D}_\varepsilon^0, \quad (\alpha, u, \beta) \longmapsto (u, \beta), \quad (20)$$

doubles ramifiés en quatre points de courbes elliptiques :

$$\mathcal{D}_\varepsilon^0 : u^2 = (c_1\beta^2 - 2\varepsilon c_2\beta - 1)^2 - 4c_4\beta^4. \quad (21)$$

Soit

$$\mathcal{L}(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i}) = \{f \text{ méromorphe sur } : (f) + \mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i} \geq 0\},$$

l'espace vectoriel des fonctions  $f$  méromorphes telles que  $(f) + \mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i} \geq 0$ , i.e., l'ensemble des fonctions holomorphes en dehors de  $\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i}$  et ayant au plus des pôles le long de  $\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i}$ . En utilisant les séries de Laurent obtenues précédemment, on montre que cet espace est engendré par les huit fonctions suivantes :

$$\begin{aligned}
f_0 &= 1, \quad f_1 = m_1, \quad f_2 = m_2, \quad f_3 = m_3, \quad f_4 = \gamma_3, \quad f_5 = f_1^2 + f_2^2, \\
f_6 &= 4f_1f_4 - f_3f_5, \quad f_7 = (f_2\gamma_1 - f_1\gamma_2)f_3 + 2f_4\gamma_2.
\end{aligned} \quad (22)$$

En outre, l'application

$$(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i}) \longrightarrow \mathbb{C}\mathbb{P}^7, p = (\alpha, u, \beta) \longmapsto \lim_{t \rightarrow 0} t(1, f_1(p), \dots, f_7(p)) =$$

$$(0, \alpha, \pm i, \pm i, \beta, \pm i\alpha\beta, \varepsilon(\alpha^2 - 1)\beta^2, \pm i(\mp c_2 + c_1\beta - 2(\alpha^2 - 1)\beta^3)),$$

plonge  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  dans  $\mathbb{C}\mathbb{P}^7$  de telle façon que  $\mathcal{D}_{\varepsilon=i}$  intersecte  $\mathcal{D}_{\varepsilon=-i}$  transversalement en quatre points à l'infini  $(\alpha = \pm 1, u = \pm\beta^2\sqrt{c_1^2 - 4c_4}, \beta = \infty)$

et que le genre géométrique de  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  est 9. Les orbites du champ de vecteurs en question passant à travers  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  forment une surface lisse  $\Sigma$  tout le long de  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  tel que :  $\Sigma \setminus (\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i}) \subset M_c$ . La variété  $\widetilde{M}_c = M_c \cup \Sigma$ , est lisse, compacte et connexe. En outre, le champ de vecteur est régulier le long du diviseur  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$ , transversal en tout point  $\beta \neq 0$  (resp.  $\beta \neq \infty$ ) et doublement tangent en  $\beta = 0$  (resp.  $\beta = \infty$ ). Les champs de vecteurs engendrés par  $H_1$  et  $H_4$  se prolongent de façon holomorphe et demeurent indépendants sur la variété  $\widetilde{M}_c$ . La variété  $\widetilde{M}_c$  est une surface abélienne sur laquelle le flot hamiltonien (16) se linéarise. L'involution  $\sigma$  (17) sur la variété affine  $M_c$  se transforme en une involution

$$\sigma_\varepsilon : \mathcal{D}_\varepsilon \longrightarrow \mathcal{D}_\varepsilon, \quad (\alpha, u, \beta) \longmapsto (-\alpha, u, \beta),$$

sur la surface de Riemann  $\mathcal{D}_\varepsilon$  (19) et admet huit points fixes donnés par les points de branchements de  $\mathcal{D}_\varepsilon$  sur la courbe elliptique  $\mathcal{D}_\varepsilon^0$  (21). Donc l'involution en question possède seize points fixes au total, confirmant ainsi le nombre de points fixes qu'une involution  $z \mapsto -z$  sur une variété abélienne doit en avoir. Il existe sur la surface abélienne  $\widetilde{M}_c$  deux différentielles holomorphes  $dt_1$  et  $dt_2$  telles que :

$$\begin{aligned} dt_1|_{\mathcal{D}_\varepsilon} &= \omega_1 = \frac{k_1(\alpha^2 - 1)\beta^2 d\beta}{\alpha u}, \\ dt_2|_{\mathcal{D}_\varepsilon} &= \omega_2 = \frac{k_2 d\beta}{\alpha u}, \end{aligned}$$

où  $k_1, k_2 \in \mathbb{C}$  et  $\omega_1, \omega_2$  sont des différentielles holomorphes sur  $\mathcal{D}_\varepsilon$ . En outre, l'espace des différentielles holomorphes sur le diviseur  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  est

$$\left\{ f_1^{(0)} \omega_2, f_2^{(0)} \omega_2, \dots, f_7^{(0)} \omega_2 \right\} \oplus \{ \omega_1, \omega_2 \},$$

où  $f_1^{(0)}, f_2^{(0)}, \dots, f_7^{(0)}$  sont les premiers coefficients des fonctions  $f_1, f_2, \dots, f_7 \in \mathcal{L}(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  (66) et le plongement de  $(\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i})$  dans  $\mathbb{CP}^7$  est à deux différentielles holomorphes près le plongement canonique

$$p = (\alpha, u, \beta) \in (\mathcal{D}_{\varepsilon=i} + \mathcal{D}_{\varepsilon=-i}) \longmapsto \left\{ \omega_2, f_1^{(0)} \omega_2, f_2^{(0)} \omega_2, \dots, f_7^{(0)} \omega_2 \right\} \in \mathbb{CP}^7.$$

La surface abélienne  $\widetilde{M}_c$  est caractérisée comme étant la duale de variété Prym  $(\mathcal{D}_\varepsilon/\mathcal{D}_\varepsilon^0)$  du revêtement double (20). Les solutions sous forme de séries de Laurent (théorème 1), jouent un rôle crucial dans la preuve de ces résultats.

## Références

- [1] ADLER M. AND VAN MOERBEKE P. : The complex geometry of the Kowalewski-Painlevé analysis. *Invent. Math.* **97** (1989) 3-51.

- [2] ARNOLD V.I. : Ordinary differential equations. Springer-Textbook, 3rd edition, 1992.
- [3] CARTAN H. : Théorie élémentaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes. Hermann, 1961.
- [4] FRANCOISE J.P. : Integrability of quasi-homogeneous vector fields (*preprint*).
- [5] GRIFFITHS P.A. AND HARRIS, J. : Principles of algebraic geometry. Wiley-Interscience, New York, 1978.
- [6] HAINE L. : Geodesic flow on  $SO(4)$  and Abelian surfaces. *Math. Ann.* **263** (1983) 435-472.
- [7] HILLE E. : Ordinary differential equations in the complex domain. Wiley-Interscience, New-York, 1976.
- [8] LESFARI A. : Abelian surfaces and Kowalewski's top. *Ann. Scient. École Norm. Sup.*, Paris, sér. 4 **21** (1988) 193-223.
- [9] LESFARI A. : Eléments d'analyse. Sochepress-Université, Casablanca, 1991.
- [10] LESFARI A. : Completely integrable systems : Jacobi's heritage. *J. Geom. Phys.* **31** (1999) 265-286.
- [11] LESFARI A. : Le théorème d'Arnold-Liouville et ses conséquences. *Elem. Math.* (Issue 1) **58** (2003) 6-20.
- [12] LESFARI A. : Analyse des singularités de quelques systèmes intégrables. *C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I* **341** (2005) 85-88.
- [13] LESFARI A. : Abelian varieties, surfaces of general type and integrable systems. *Beiträge Algebra Geom.*, Vol.48, 1 (2007) 95-114.
- [14] LESFARI A. : Integrable systems and complex geometry. *arXiv : 0706.1579 [math. CV]* (2007) 1-45.
- [15] LESFARI A. : Fonctions et Intégrales elliptiques. *arXiv : 0707.1137 [math. DS]* (2007) 1-46.
- [16] PAINLEVE P. : Oeuvres : tomes 1,2,3. Edition du C.N.R.S. 1975.